

Жар: так организм борется с болезнью



НАПОМИНАЕМ: в кабинет врача можно звонить в любое время суток, 7 дней в неделю. Это “дом вашего здоровья”.

Если у ребенка жар, но он по-прежнему играет и ест, его можно лечить дома. Но если ребенок выглядит больным и не хочет играть или есть, его следует показать врачу, независимо от температуры. В случае сомнений звоните врачу. Сообщите, какая у ребенка температура, и где вы измеряли ее: под языком, в подмышечной впадине, и т.д.

Возраст до 2 месяцев

ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ 38°C (100,5°F): СРОЧНО

звоните врачу. Не давайте никаких лекарств. Жар у младенца может быть признаком опасной инфекции.

Возраст 3 месяца и старше

ТЕМПЕРАТУРА 38°-40°C (100,5°- 104°F): Звоните врачу, если температура не понижается 2 дня или если ребенку меньше 6 месяцев.
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 40°C (104°F) И ВЫШЕ: Возможно, у ребенка инфекция и ему необходимы антибиотики. Звоните врачу.

При любом повышении температуры

Если ребенку меньше 6 месяцев, применяйте от температуры тайленол (Tylenol, он же ацетаминофен (acetaminophen)).

Детям в возрасте 6 месяцев и старше можно давать как тайленол (Tylenol), он же ацетаминофен (acetaminophen), так и адвил (Advil) или мотрин (Motrin), он же ибупрофен (ibuprofen). Следите за тем, чтобы ребенок больше отдыхал и пил много жидкости.

Когда ехать в ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ или звонить 911

СРОЧНО поезжайте в отделение скорой помощи или звоните 911, если отсутствие помощи опасно для жизни или здоровья ребенка!

- если ребенка очень трудно разбудить;
- если у него красная сыпь под кожей, которая не бледнеет при нажатии;
- если у него неподвижная шея, головная боль или отек родничка;
- при судорогах/приступе (неподвижный взгляд или необычные движения).



TCPi Transforming Clinical Practices Initiative Pediatrics

Russian 10/18

Жар: так организм борется с болезнью



НАПОМИНАЕМ: в кабинет врача можно звонить в любое время суток, 7 дней в неделю. Это “дом вашего здоровья”.

Если у ребенка жар, но он по-прежнему играет и ест, его можно лечить дома. Но если ребенок выглядит больным и не хочет играть или есть, его следует показать врачу, независимо от температуры. В случае сомнений звоните врачу. Сообщите, какая у ребенка температура, и где вы измеряли ее: под языком, в подмышечной впадине, и т.д.

Возраст до 2 месяцев

ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ 38°C (100,5°F): СРОЧНО

звоните врачу. Не давайте никаких лекарств. Жар у младенца может быть признаком опасной инфекции.

Возраст 3 месяца и старше

ТЕМПЕРАТУРА 38°-40°C (100,5°- 104°F): Звоните врачу, если температура не понижается 2 дня или если ребенку меньше 6 месяцев.
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 40°C (104°F) И ВЫШЕ: Возможно, у ребенка инфекция и ему необходимы антибиотики. Звоните врачу.

При любом повышении температуры

Если ребенку меньше 6 месяцев, применяйте от температуры тайленол (Tylenol, он же ацетаминофен (acetaminophen)).

Детям в возрасте 6 месяцев и старше можно давать как тайленол (Tylenol), он же ацетаминофен (acetaminophen), так и адвил (Advil) или мотрин (Motrin), он же ибупрофен (ibuprofen). Следите за тем, чтобы ребенок больше отдыхал и пил много жидкости.

Когда ехать в ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ или звонить 911

СРОЧНО поезжайте в отделение скорой помощи или звоните 911, если отсутствие помощи опасно для жизни или здоровья ребенка!

- если ребенка очень трудно разбудить;
- если у него красная сыпь под кожей, которая не бледнеет при нажатии;
- если у него неподвижная шея, головная боль или отек родничка;
- при судорогах/приступе (неподвижный взгляд или необычные движения).



TCPi Transforming Clinical Practices Initiative Pediatrics

Russian 10/18